Προδιαγραφές

MIC Test Strip amphotericin B

Ταινίες χάρτινες εμπλουτισμένες με διαδοχικές αραιώσεις του αντιμυκητιακού amphotericin B, συγκέντρωσης
0,002 - 32 μg/mL, για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας έναντι μυκήτων, με σκοπό τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας.
Να διατίθενται σε kit συσκευασίας των 30 ταινιών.

MIC Test Strip voriconazole

Ταινίες χάρτινες εμπλουτισμένες με διαδοχικές αραιώσεις του αντιμυκητιακού voriconazole, συγκέντρωσης
0,002 - 32 μg/mL, για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας έναντι μυκήτων, με σκοπό τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας.
Να διατίθενται σε kit συσκευασίας των 30 ταινιών.

MIC Test Strip caspofugin

Ταινίες χάρτινες εμπλουτισμένες με διαδοχικές αραιώσεις του αντιμυκητιακού caspofugin, συγκέντρωσης 0,002 - 32 μg/mL, για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας έναντι μυκήτων, με σκοπό τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας.
Να διατίθενται σε kit συσκευασίας των 30 ταινιών.

MIC Test Strip itraconazole

Ταινίες χάρτινες εμπλουτισμένες με διαδοχικές αραιώσεις του αντιμυκητιακού itraconazole, συγκέντρωσης 0,002 - 32 μg/mL, για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας έναντι μυκήτων, με σκοπό τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας.
Να διατίθενται σε kit συσκευασίας των 30 ταινιών.

MIC Test Strip flucytosin

Ταινίες χάρτινες εμπλουτισμένες με διαδοχικές αραιώσεις του αντιμυκητιακού flucytosin, συγκέντρωσης 0,002 - 32 μg/mL, για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας έναντι μυκήτων, με σκοπό τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας.
Να διατίθενται σε kit συσκευασίας των 30 ταινιών.

MIC Test Strip micafungin

Ταινίες χάρτινες εμπλουτισμένες με διαδοχικές αραιώσεις του αντιμυκητιακού micafungin, συγκέντρωσης 0,002 - 32 μg/mL, για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας έναντι μυκήτων, με σκοπό τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας.
Να διατίθενται σε kit συσκευασίας των 30 ταινιών.

MIC Test Strip isavuconazole

Ταινίες χάρτινες εμπλουτισμένες με διαδοχικές αραιώσεις του αντιμυκητιακού isavuconazole, συγκέντρωσης
0,002 - 32 μg/mL για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας έναντι μυκήτων, με σκοπό τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας.
Να διατίθενται σε kit συσκευασίας των 30 ταινιών.